

Thông tin cho Điều dưỡng:

CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY

**Kính gửi: Các khoa Lâm sàng bệnh viện;
Phòng khám ĐKKV Mepu, Trà Tân.**

Khoa Dược thông tin đến các khoa Lâm sàng và 02 Phòng khám ĐKKV Mepu và Trà Tân một số thông tin về các thuốc điều trị tiêu chảy như sau:

1. Đại cương:

Tiêu chảy là tình trạng tăng số lần đại tiện, tăng thể tích và độ lỏng của phân. Nguyên nhân có thể do nhiễm khuẩn, rối loạn nội tiết, rối loạn đường tiêu hóa hoặc do dùng thuốc.

Trong điều trị tiêu chảy, ngoài việc điều trị nguyên nhân gây ra tiêu chảy (kháng sinh, hormone, thay đổi chế độ ăn, thay đổi thuốc,...), vấn đề ưu tiên trong mọi trường hợp là đánh giá và xử lý đúng tình trạng cân bằng nước và điện giải.

Các nhóm thuốc thường dùng hỗ trợ trong điều trị tiêu chảy gồm: dung dịch uống bù nước và điện giải, các vi sinh vật đường ruột, các chất hấp phụ, bao phủ niêm mạc ruột. Thuốc kháng nhu động đôi khi được dùng để giảm số lần đại tiện cho bệnh nhân.

Đối với trẻ em, không nên dùng các thuốc dùng làm giảm triệu chứng của bệnh tiêu chảy như thuốc hấp phụ, thuốc bao phủ niêm mạc, thuốc giảm nhu động ruột vì các thuốc này không làm giảm được sự mất dịch và điện giải, mà còn có thể gây ra nhiều tác dụng có hại.

2. Các nhóm thuốc điều trị tiêu chảy có sử dụng tại bệnh viện

Tên thuốc	Hoạt chất/ thành phần	Cơ chế	Chỉ định
Europulgite	Attapulgite hoạt hóa	Hấp phụ	Tiêu chảy trong trường hợp bệnh đại tràng cấp và mạn có kèm tăng nhu động ruột. Chống chỉ định: trẻ em tiêu chảy cấp hoặc quá mẫn với thành phần của thuốc.
Ozonbiotic extra; Bailuzym - Zn	Lactobacillus acidophilus + Bacillus subtilis + kẽm gluconat	Vi sinh đường ruột	Tiêu chảy do nhiễm khuẩn, do kháng sinh và hóa trị; viêm ruột cấp/mạn tính; rối loạn tiêu hóa (chướng bụng, đầy hơi, táo bón); rối loạn cân bằng vi sinh ruột do rượu, stress, du lịch; dự phòng các biến chứng đường tiêu hóa
Diosmectit	Diosmectit	Hấp phụ	Tiêu chảy cấp và mạn tính ở người lớn và trẻ em. Điều trị các triệu chứng của bệnh thực quản, dạ dày, tá tràng và ruột.

Grafort	Dioctahedral smectite	Hấp phụ	Tiêu chảy cấp và mạn tính. Điều trị các triệu chứng đau có liên quan đến các bệnh viêm thực quản, dạ dày và ruột.
Tozinat	Kẽm gluconat	Điều trị hỗ trợ, bảo vệ niêm mạc ruột	Bổ sung kẽm trong tiêu chảy cấp và mạn tính.
ORS; Oremute 5	Natri chloride + natri citrate + kali chloride + glucose + kẽm gluconat	Bù nước và điện giải	Bổ sung kẽm và các chất điện giải trong điều trị tiêu chảy cấp từ nhẹ đến trung bình, giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe, giảm nguy cơ mắc đợt tiêu chảy mới trong những tháng tiếp theo.

Đức Linh, ngày 22 tháng 6 năm 2016

KHOA DƯỢC



DSCK1. Võ Siuong